

DAPSOGEL® DAPSONA

Gel dérmico 7,5%
Venta bajo receta
Industria Argentina

**Gel dérmico: Para uso dermatológico solamente.
No apto para uso oftálmico.**

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

LEA TODO EL PROSPECTO DETENIDAMENTE ANTES DE EMPEZAR A USAR EL MEDICAMENTO.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarlas.
- Si considera que alguno de los eventos adversos que sufre es grave o si observa cualquier evento adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico.

¿Qué contiene este prospecto?

1. Qué es DAPSOGEL® y para que se utiliza
2. Qué personas no pueden recibir DAPSOGEL®
3. Qué necesita saber antes de usar DAPSOGEL®
4. Cómo aplicar DAPSOGEL®
5. Los posibles efectos adversos
6. Cómo conservar DAPSOGEL®
7. Presentación

1. Qué es DAPSOGEL® y para que se utiliza

La Dapsona tópica se usa para tratar el acné. La Dapsona pertenece a una clase de medicamentos llamados sulfonas, con acción antibiótica y antiinflamatoria.

Fórmula: Cada 100 g de DAPSOGEL® 7,5% contiene: Dapsona 7,5 g, excipientes c.s.

2. Qué personas no pueden recibir DAPSOGEL®

DAPSOGEL® está contraindicado en personas con hipersensibilidad a Dapsona o a algún otro componente de la fórmula.

3. Qué necesita saber antes de usar DAPSOGEL®

Antes de usar Dapsona:

- Informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la Dapsona, a cualquier medicamento derivado de la sulfonamida ("sulfás") o a cualquiera de los ingredientes de la Dapsona en gel.
- Informe a su médico y farmacéutico acerca de qué otros medicamentos con y sin receta médica, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o tiene planificado tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera de los siguientes: paracetamol (acetaminofeno); medicamentos anticonvulsivos como la fenitoína; medicamentos contra la malaria como cloroquina, primaquina y quinina; Dapsona (por vía oral); nitrofurantoina; nitroglicerina; fenobarbital; pirimetamina; rifampicina o medicamentos que contienen sulfonamida, incluyendo el co-trimoxazol. Es posible que su médico deba cambiar las dosis de

sus medicamentos o supervisarle atentamente para saber si sufre efectos secundarios.

- Informe a su médico qué productos a base de hierbas está tomando, especialmente la hierba de San Juan.
- Informe a su médico si padece o ha padecido anemia hemolítica (disminución del número de glóbulos rojos por destrucción anormal), deficiencia de deshidrogenasa glucosa-6-fosfato (G-6PD) (un trastorno hereditario de la sangre) o metahemoglobinemia (alteración de la hemoglobina de los glóbulos rojos).
- Informe a su médico si está embarazada, tiene planificado quedar embarazada o está amamantando. Llame a su médico si queda embarazada mientras usa Dapsona. Informe a su médico si está amamantando porque se sabe que el medicamento pasa a la leche materna y podría generar reacciones adversas en el lactante.
- Si va a someterse a una cirugía, incluso una cirugía dental, informe a su médico o dentista que está usando Dapsona. Informe a su médico si usa productos tópicos que contengan peróxido de benzoilo; (se encuentra en muchos productos tópicos para el acné). El uso simultáneo de productos de peróxido de benzoilo con la Dapsona en gel puede causar que su piel o cabello facial se vuelva transitoriamente de color amarillo o anaranjado.

Pediatría:

No se recomienda el uso de DAPSOGEL® en pacientes menores de 12 años.

Geriatría:

Los estudios clínicos publicados no incluyeron un número suficiente de pacientes de 65 años, o de mayor edad, a fin de poder determinar si responden en forma distinta en relación con los pacientes de menos edad.

4. Cómo aplicar DAPSOGEL®

La presentación DAPSOGEL® es para aplicarse en la piel.

Por lo general se aplica una vez (gel al 7.5%) al día.

Si no se observa ninguna mejoría después de 12 semanas de aplicación deberá consultar al médico sobre la conveniencia de seguir o discontinuar el tratamiento.

Siga estos pasos para usar DAPSOGEL®

1. Lave con cuidado la piel afectada y séquela con una toalla suave.
2. Use sus dedos para esparcir una cantidad del tamaño de una arveja como una capa delgada de gel sobre la cara y las otras áreas afectadas.
3. Frote el gel suave y totalmente. Es posible que se sienta arenoso y podría ver partículas en el gel.
4. Ponga la tapa de nuevo en el tubo de gel y ciérrelo herméticamente.
5. Lave sus manos de inmediato después de aplicar el gel.

DAPSOGEL® no debe tomarse por vía oral ni aplicarse en ojos o mucosas. (uso exclusivo en la piel)

¿Qué tengo que hacer si me olvido de aplicar una dosis?

Aplique la dosis que omitió tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si ya casi es hora de la próxima dosis, omita la dosis que le faltó y continúe con su programa regular de dosificación. No aplique gel adicional para compensar una dosis que omitió.

5. Los posibles efectos adversos

¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar este medicamento?

Como todos los medicamentos, este medicamento puede causar efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Informe a su médico si alguno de estos síntomas es intenso o no desaparece:

- enrojecimiento o ardor de la piel,
- sequedad de la piel,
- piel grasosa o que se pela,
- picazón.

Algunos efectos secundarios pueden ser graves. Si experimenta cualquiera de estos síntomas, deje de usar la Dapsona y llame a su médico de inmediato:

- hormigueo, ardor o adormecimiento de las manos o los pies,
- debilidad muscular,
- color gris azulado en los labios, uñas o en la parte interior de la boca,
- dolor de espalda,
- dificultad para respirar,
- cansancio,
- debilidad,
- orina de color marrón,
- fiebre,
- piel amarilla o pálida.

La Dapsona tópica puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras usa este medicamento. Si considera que alguno de los eventos adversos que sufre es grave o si presenta cualquier evento adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico.

Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la página Web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247
Hospital A. Posadas : (011) 4654-6648 / 4658-7777

6. Cómo conservar DAPSOGEL®

Mantenga este medicamento en su envase original, cerrado herméticamente y fuera del alcance de los niños. Almacénelo a temperatura ambiente, entre 15 y 30° C y lejos del exceso de calor y de la humedad (no en el baño). No congele este medicamento.

¿Tiene Ud. alguna pregunta?

Laboratorio Dr. Lazar
011-5550-2900

www.lazar.com.ar
ANMAT Responde
0800-333-1234

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Presentación:

Envase conteniendo 30 g.

Especialidad Medicinal autorizada por el
Ministerio de Salud.
Certificado N° 58.708



LAZAR

Dr. LAZAR y Cía. S.A.Q. e I.
Av. Vélez Sarsfield 5853/5855
B1605EPI Munro, Pcia. de Buenos Aires
Directora Técnica: Daniela A. Casas,
Farmacéutica y Bioquímica.

Fecha última revisión del prospecto: 26/04/2018

36508/2
P317