

**FANGAN® DUO**  
**KETOCONAZOL - CLINDAMICINA**

Óvulos vaginales  
Venta bajo receta  
Industria Argentina

**INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE**

**LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES  
DE USAR EL MEDICAMENTO**

**¿Qué contiene FANGAN® Duo?**

Cada óvulo vaginal contiene: Ketoconazol: 400,00 mg;  
Clindamicina (como fosfato): 100,00 mg; Excipientes: c.s.

**Acción Terapéutica:**

Este medicamento es un antimicrobiano tópico de uso local a nivel vaginal.

**¿Para qué se usa FANGAN® Duo?**

**FANGAN® Duo** está indicado en pacientes con vaginosis bacteriana o mixtas (infección causada por la multiplicación excesiva de bacterias y hongos dañinos en la vagina).

La clindamicina vaginal se usa para tratar la infección por bacterias y el ketoconazol se lo utiliza para tratar la infección por un hongo.

**¿Qué personas no pueden recibir FANGAN® Duo?**

No use este medicamento si Ud. sabe que es alérgico a algunos de los ingredientes del medicamento, o si tiene antecedentes de colitis (inflamación del colon, porción del intestino) asociada a antibióticos.

**¿Qué cuidados debo tener antes de usar este medicamento?**

Si Ud. está tomando algún otro medicamento, o si está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de usar este medicamento.

Informe a su médico si padece colitis (inflamación del colon), diarrea o materia fecal con sangre.

**¿Qué cuidados debo tener mientras estoy usando este medicamento?**

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento.

Los efectos secundarios más frecuentes con **FANGAN® Duo** son sequedad de la vagina, irritación y prurito (picazón), sensación de ardor y quemazón en la zona a tratar, alteraciones que desaparecen con la suspensión del tratamiento.

Ante cualquier duda o aparición de algún síntoma, sobre todo fiebre, diarrea o materia fecal con sangre durante el tratamiento, consulte de inmediato con su médico.

Tenga en cuenta que no debe tener relaciones sexuales vaginales ni usar productos vaginales como tampones durante el tratamiento con **FANGAN® Duo**.

**¿Cómo se usa FANGAN® Duo?**

Siga exactamente las instrucciones de administración de **FANGAN® Duo** indicadas por su médico. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas. Pida a su médico que le aclare cualquier cuestión que no entienda contenida en el prospecto que acompaña al medicamento.

**FANGAN® Duo** (un óvulo) se lo coloca dentro de la vagina una vez al día, preferentemente a la noche antes de acostarse durante 7 días.

La dosis puede ser modificada por el médico de acuerdo a la necesidad de cada paciente.

No se auto-medique con **FANGAN® Duo**. Es importante que usted no se administre mayor cantidad de **FANGAN® Duo** que lo indicado por su médico. Si olvida una dosis, aplíquese la en cuanto se acuerde. No obstante, si ya casi es hora de la dosis siguiente, deje pasar la que olvidó y continúe con su horario de medicación normal. No se aplique una dosis doble para compensar la que olvidó.

Administrado el producto por la vía indicada, no existe riesgo de sobredosis. No obstante, ante una eventual ingesta accidental, póngase en contacto con su médico.

**¿Qué debo hacer ante una sobredosis o ante una ingesta accidental?**

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

---

Hospital de Pediatría "Ricardo Gutiérrez" (011)  
4962-6666 / 2247

Hospital A. Posadas : (011) 4654-8648 / 4658-7777  
Hospital de Pediatría Dr. Garrahan: (011) 4941-8650  
Hospital de Clínicas Gral. San Martín: (011)4961-6001

---

**¿Tiene Ud. alguna pregunta?**

Laboratorio Dr. Lazar  
011-5550-2900  
www.lazar.com.ar  
ANMAT Responde  
0800-333-1234

**Conservación:**

Conservar en lugar seco, a menos de 30°C.  
No utilizar luego de la fecha de vencimiento.

---

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

---

Especialidad medicinal autorizada por  
el Ministerio de Salud. Certificado N° 57.490



**Dr. LAZAR y Cia. S.A.Q. e I.**  
Av. Vélez Sarsfield 5853/5855  
B1605EPI Munro, Pcia. de Buenos Aires  
Directora Técnica: Daniela A. Casas,  
Farmacéutica y Bioquímica.

Fecha de aprobación de información para el paciente:  
31/07/2014

36749/4  
P224