

NEBICOR®

NEBIVOLOL

Comprimidos
Venta bajo receta
Industria Argentina

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿Qué contiene NEBICOR®?

Cada comprimido de 2,5mg, 5 mg y 10 mg contiene: Nebivolol 2,50 mg Nebivolol 5,00 mg Nebivolol 10,00 mg, respectivamente. Excipientes c.s.

Acción Terapéutica:

Este medicamento es un antihipertensivo; sirve para reducir la presión arterial elevada.

¿Para qué se usa NEBICOR®?

NEBICOR® contiene nebivolol y se utiliza para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión).

El nebivolol es un medicamento con acción cardiovascular, perteneciente al grupo de agentes betabloqueantes selectivos (con actividad selectiva en el sistema cardiovascular). Previene el aumento de la frecuencia cardíaca, y regula la fuerza de bombeo del corazón. También actúa ensanchando los vasos sanguíneos, lo cual ayuda a disminuir la presión arterial.

¿Qué personas no pueden recibir NEBICOR®?

No use este medicamento si Ud. sabe que es alérgico a algunos de los ingredientes del medicamento.

Debe informar a su médico si está embarazada o si piensa que pudiera estarlo o si estuviera amamantando. Su médico le aconsejará tomar otro medicamento en lugar de Nebicor® si lo considera necesario.

No tome NEBICOR® si usted padece una o más de las siguientes alteraciones:

- Sufre de insuficiencia cardíaca y se encuentra en la unidad de cuidados intensivos o necesita medicamentos para mantener la circulación sanguínea.
- Tiene un ritmo cardíaco lento o si su corazón se saltea latidos (ritmo cardíaco irregular).
- Tiene daño hepático grave.

No se recomienda el uso de NEBICOR® en niños y adolescentes debido a la ausencia de datos sobre el uso de este medicamento en este tipo de pacientes.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

Si Ud. está tomando algún otro medicamento, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Informe a su médico si padece algunos de los siguientes trastornos:

- Un tipo de dolor torácico, debido a un espasmo espontáneo de las arterias del corazón, denominado Angina de Prinzmetal.
- Bloqueo cardíaco de 1er grado (alteración leve de la conducción cardíaca que afecta al ritmo cardíaco).
- Latido del corazón anormalmente lento.
- Insuficiencia cardíaca crónica que no está siendo tratada.
- Lupus eritematoso (una enfermedad por autoinmunidad).
- Psoriasis (una enfermedad de la piel caracterizada por manchas escamosas), o si ha padecido alguna vez psoriasis.
- Aumento de actividad de la glándula tiroides: este medicamento puede enmascarar los signos provocados por esta alteración, tales como frecuencia cardíaca anormalmente alta.
- Circulación deficiente en brazos o piernas, como por ejemplo la enfermedad o síndrome de Raynaud's, dolor al caminar parecido a un calambre.
- Alergias: este medicamento puede intensificar su reacción al polen u otras sustancias a las que sea alérgico.
- Problemas respiratorios crónicos.
- Diabetes

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento.

Los efectos adversos más frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas) observados con los betabloqueantes son:

- Dolor de cabeza.
- Mareo.
- Cansancio.
- Sensación poco común de quemazón, cosquillas u hormigueo en la piel.
- Diarrea.
- Impotencia
- Estreñimiento.
- Náuseas.
- Dificultad para respirar, sensación de falta de aire.

Ante cualquier duda o aparición de algún síntoma durante el tratamiento, consulte con su médico.

¿Cómo se usa NEBICOR®?

Siga exactamente las instrucciones de administración de NEBICOR® indicadas por su médico. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas. Pida a su médico que le aclare cualquier cuestión que no entienda contenida en el prospecto que acompaña al medicamento.

NEBICOR® se administra oralmente en un comprimido una vez al día con un poco de agua, con o sin alimentos. La dosis puede ser modificada por el médico de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Si olvidó tomar su dosis a su hora, tómela lo antes posible, y después continúe con el esquema de dosificación habitual. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

No se auto-medique con NEBICOR®. Es importante que usted no ingiera mayor cantidad de NEBICOR® que lo indicado por su médico.