

LIPONORM®

ATORVASTATINA

Comprimidos Recubiertos
Venta Bajo Receta
Industria Argentina

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

Este medicamento puede obtenerse bajo prescripción médica.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Este medicamento ha sido prescripto solo para su problema actual. No lo recomiende a otras personas.
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
- Si presenta algún efecto adverso descrito o efecto adverso no reportado CONSULTAR A UN MÉDICO.

En este prospecto:

1. Qué contiene LIPONORM® y qué es atorvastatina
2. Para qué se utiliza
3. Quiénes no pueden recibir este medicamento
4. Antes de tomar LIPONORM®
5. Posibles efectos adversos.
6. Cómo tomar LIPONORM®
7. Información adicional para el paciente

1. ¿Qué contiene LIPONORM®?

LIPONORM® Cada comprimido de 10 mg contiene: atorvastatina 10 mg. Excipientes c.s.

LIPONORM® Cada comprimido de 20 mg contiene: atorvastatina 20 mg. Excipientes c.s.

LIPONORM® Cada comprimido de 40 mg contiene: atorvastatina 40 mg. Excipientes c.s.

Acción Terapéutica:

Este medicamento contiene atorvastatina, que pertenece a un grupo de drogas denominadas "estatinas." El atorvastatina reduce los niveles sanguíneos de colesterol "malo" (lipoproteína de baja densidad, o LDL, por sus siglas en inglés) y triglicéridos, mientras aumenta los niveles del colesterol "bueno" (lipoproteína de alta densidad, o HDL, por sus siglas en inglés).

2. ¿Para qué se usa LIPONORM®?

LIPONORM® se utiliza para reducir las grasas como el colesterol y los triglicéridos en la sangre cuando una dieta baja en grasas y los cambios en el estilo de vida por sí solos han fracasado. Si usted presenta un riesgo elevado de enfermedad cardíaca, **LIPONORM®** también puede utilizarse para reducir este riesgo incluso aunque sus niveles de colesterol sean normales. Durante el tratamiento debe seguirse una dieta estándar baja en colesterol.

3. ¿Qué personas no pueden recibir LIPONORM®?

No use este medicamento:

- Si Ud. sabe que es alérgico a algunos de los ingredientes del medicamento.
- Si tiene una enfermedad del hígado;
- Si usted está embarazada o amamantando.
- Si es una mujer en edad fértil y no utiliza medidas anticonceptivas adecuadas.

La experiencia en población pediátrica es limitada por lo que no se recomienda el uso de **LIPONORM®** en niños.

4. ¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

Si Ud. está tomando algún otro medicamento, si está embarazada o si está dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Para asegurarse que el atorvastatina es seguro para usted, dígame a su médico si usted tiene:

- dolor o debilidad muscular;
- antecedentes de enfermedad del hígado;
- antecedentes de enfermedad del riñón;
- antecedentes de accidente cerebrovascular;
- algún trastorno de la glándula tiroidea;
- si usted bebe más de 2 bebidas alcohólicas al día.

Ciertas otras drogas pueden aumentar su riesgo de problemas musculares graves, y es muy importante que su médico conozca si está usando alguna de estas. Dígame a su médico todos los medicamentos que usa, y cualquiera que comience o deje de usar, especialmente:

- antibióticos o medicina para los hongos;
- uso de anticonceptivos
- medicamentos para reducir el colesterol;
- medicamentos para el corazón;
- medicamentos para tratar el VIH o SIDA.

Esta lista no está completa. Otras drogas pueden interactuar con atorvastatina, incluyendo medicamentos que se obtienen con o sin receta, vitaminas, y productos herbarios. No todas las interacciones posibles aparecen en esta guía del medicamento.

5. ¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

Como todo medicamento **LIPONORM®** puede causar efectos adversos en algunas personas.

Busque atención médica de emergencia si tiene síntomas de una reacción alérgica luego de tomar **LIPONORM®**: ronchas, dificultad para respirar; hinchazón de la cara, labios, lengua, o garganta.

En casos raros, el atorvastatina puede afectar y lesionar el tejido muscular, llevando (en cuadros graves) a una insuficiencia renal.

Llame a su médico de inmediato si usted siente dolor muscular inexplicable, sensibilidad, o debilidad especialmente si usted también tiene fiebre, cansancio inusual, y orina oscura.

También llame a su médico de inmediato si usted tiene:

- problemas del riñón--orina muy escasa, dolor o dificultad al orinar, hinchazón en sus pies o tobillos, sensación de cansancio o le falta aire al respirar;
- problemas del hígado--náusea, dolor en la parte superior del estómago, picazón, sensación de cansancio, pérdida del apetito, orina oscura, materia fecal de color arcilla, ictericia (color amarillo de la piel u ojos); o
- signos de accidente cerebrovascular--entumecimiento o debilidad repentina (especialmente en un lado de su cuerpo), dolor de cabeza repentino y severo, dificultad para hablar, problemas con la visión o el equilibrio.

Efectos secundarios comunes pueden incluir:

- dolor muscular o de las articulaciones;
- diarrea;
- malestar estomacal.
- alteraciones en análisis de sangre que pueden mostrar un funcionamiento anormal del hígado

Ante cualquier duda o aparición de algún otro síntoma durante el tratamiento, consulte con su médico.

6. ¿Cómo se usa LIPONORM®?

Siga exactamente las instrucciones de administración de LIPONORM® indicadas por su médico. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas. Pida a su médico que le aclare cualquier cuestión que no entienda contenida en el prospecto que acompaña al medicamento.

La dosis inicial normal de LIPONORM® es de 10 mg una vez al día en adultos. Su médico puede aumentarla si fuera necesario hasta alcanzar la dosis que usted necesita. Su médico adaptará la dosis a intervalos de 4 semanas o más. La dosis máxima de atorvastatina es de 80 mg una vez al día para adultos. Los comprimidos de LIPONORM® deben tragarse enteros con un vaso de agua y pueden tomarse a cualquier hora del día con o sin comida. No obstante, intente tomar todos los días su comprimido siempre a la misma hora.

Sin embargo, si usted olvida tomar una dosis de esta medicación, siga con la siguiente en el momento usual. No duplique la dosis.

No cambie su dosis de LIPONORM® sin la previa aprobación de su médico.

No se auto-medique con LIPONORM®. No ingiera mayor cantidad de Liponorm® que lo indicado por su médico.

7. ¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si tomé más cantidad de la necesaria?

Si usted ha tomado por accidente demasiados comprimidos de LIPONORM® consulte con su médico de inmediato.

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Hospital de Pediatría "Ricardo Gutiérrez" : (011) 4962-6666 / 2247
Hospital A. Posadas : (011) 4654-6648 / 4658-7777
Hospital de Pediatría Dr. Garrahan: (011) 4941-8650
Hospital de Clínicas Gral. San Martín: (011)4961-6001

¿Tiene Ud. alguna pregunta?

Laboratorio Dr. Lazar
011-5550-2900
www.lazar.com.ar

Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Presentación:

LIPONORM® 10 mg: Envases conteniendo 20, 30, 60 y 100 comprimidos recubiertos.

LIPONORM® 20 mg: Envases conteniendo 30, 60 y 100 comprimidos recubiertos.

LIPONORM® 40 mg: Envases conteniendo 30 comprimidos recubiertos.

Condiciones de Conservación y almacenamiento:

Conservar entre 15° C y 30° C, en lugar seco. Proteger de la luz solar directa.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N°48.128



LAZAR

Dr. LAZAR y Cía. S.A.Q. e I.
Av. Vélez Sarsfield 5853/5855
B1605EPI Munro, Pcia. de Buenos Aires
Directora Técnica: Daniela A. Casas,
Farmacéutica y Bioquímica.

Última revisión del prospecto: 17/08/16

36913/6
P220