



PARATROPINA® ANTIGAS

METILBROMURO DE HOMATROPINA 0,2% SIMETICONA 3%

Solución Gotas
Industria Argentina
Venta Libre

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿Qué contiene PARATROPINA® ANTIGAS?

Cada 100 ml de **PARATROPINA® ANTIGAS** gotas contiene: Simeticona 3,00 gramos; Metilbromuro de homatropina 0,20 gramos. Excipientes: Sacarina sódica; Carbomer 971 P NF; Esencia de dulce de leche; Sorbitol al 70%; Hidróxido de sodio; Sorbato de potasio 0,100 g; Clorhexidina digluconato al 20% 0,015 g; Propilparabeno 0,030 g; Metilparabeno 0,120 g; Alcohol etílico 2,0 ml; Agua destilada c.s.p. 100,00 ml.

Acción Terapéutica:

Antiespasmódico (calma los dolores tipo cólicos y retortijones), antifatulento (antigas).

¿Para qué se usa PARATROPINA® ANTIGAS?

PARATROPINA® ANTIGAS está indicado para el alivio de los espasmos dolorosos (cólicos o retortijones) del aparato digestivo,

la simeticona actúa disolviendo las burbujas de gas que se forman en el tubo digestivo, facilitando su eliminación.

¿Qué personas no pueden recibir PARATROPINA® ANTIGAS?

No tome este medicamento si Ud. presenta: alergia a cualquiera de los componentes de la fórmula o si usted:

- Sufre Glaucoma de ángulo estrecho (aumento de la presión ocular)
- Padece agrandamiento de próstata, tendencia a la retención urinaria o dificultades para orinar.
- Tiene náuseas, vómitos.
- El dolor abdominal se acompaña de fiebre.
- Padece colitis ulcerosa (enfermedad inflamatoria crónica intestinal) o Miastenia Gravis (enfermedad caracterizada por debilidad muscular)

No administrar en menores de 6 años.

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

Consulte a su médico antes de tomar

PARATROPINA® ANTIGAS si:

- Sufre de hipertiroidismo (aumento de hormonas tiroideas)
- Insuficiencia cardíaca.
- Hipertensión arterial.
- Enfermedad isquémica del corazón (infarto

o angina de pecho).

- Estrechamiento de la válvula mitral, reflujo gastroesofágico o hernia hiatal.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

En ningún caso se recomienda tomar **PARATROPINA® ANTIGAS** por tiempo prolongado en altas dosis. Consulte a su médico si además está tomando cualquier otro medicamento, tanto recetado como de venta libre.

Pueden aparecer efectos no deseados como: sensación de sequedad en la boca, erupciones en la piel, constipación, dificultad para orinar, enrojecimiento del rostro, dilatación de pupilas, fotofobia (molestia visual ante la luz brillante), palpitations, taquicardia (aumento de la frecuencia de los latidos) y arritmias (alteración en el ritmo de los latidos). Puede producir problemas para enfocar la vista y visión borrosa, por lo que se recomienda precaución y evitar conducir vehículos u operar maquinarias peligrosas hasta que se normalice la visión.

No tome **PARATROPINA® ANTIGAS** por más de 24 horas, sin consultar al médico. Si el dolor abdominal o los cólicos persisten más de 24 horas, o empeoran los síntomas, consulte de inmediato con el médico.

¿Cómo se usa este medicamento?

Para mayores de 12 años y adultos se sugiere tomar 40 gotas diluidas en medio vaso de agua, cada 6 u 8 horas.



Se aconseja no tomar más de 160 gotas diarias.

Niños menores de 12 años: consultar al médico.

Equivalencia: 40 gotas equivalen a aproximadamente 2 ml de solución gotas y contienen 4 mg de Homatropina metilbromuro y 60 mg de Simeticona.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si tomé más cantidad de la necesaria?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:
(011) 4962-6666 / 2247

Hospital A. Posadas:
(011) 4654-6648 / 4658-7777

Hospital de Pediatría Dr. Garrahan:
(011) 4941-8650

Hospital de Clínicas Gral. San Martín:
(011)4961-6001

¿Tiene Ud. alguna pregunta?

Laboratorio Dr. Lazar
011-5550-2900
www.lazar.com.ar
ANMAT Responde
0800-333-1234

**ANTE CUALQUIER DUDA
CONSULTE CON SU MEDICO O
FARMACEUTICO**

Presentación:

Frascos conteniendo 20 ml.

Forma de Conservación:

Mantener entre 15°C y 30°C, en su envase original.

**MANTENER FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 51.482



Dr. LAZAR y Cia. S.A.Q. e I.
Av. Vélez Sarsfield 5853/5855
B1605EPI Munro, Pcia. de Buenos Aires
Directora Técnica: Daniela A. Casas,
Farmacéutica y Bioquímica.

Fecha de última revisión: 25/7/2013

**36916/3
P213**