

ANTITROM®
RIVAROXABÁN
Comprimidos recubiertos
Venta bajo receta
Industria Argentina

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿Qué contiene ANTITROM®?

Cada comprimido recubierto de **ANTITROM®** de 15,0 mg contiene: Rivaroxabán 15,0 mg. Excipientes c.s.
Cada comprimido recubierto de **ANTITROM®** de 20,0 mg contiene: Rivaroxabán 20,0 mg. Excipientes c.s.

Acción Terapéutica:

Este medicamento es un anticoagulante que previene la formación de coágulos de sangre en la circulación.

¿Para qué se usa ANTITROM®?

ANTITROM® está indicado para prevenir o tratar la aparición de coágulos en la venas internas de los miembros inferiores o abdomen (trombosis venosa profunda -TVP-), los cuales pueden desprenderse y obstruir la circulación pulmonar (embolia pulmonar). Una TVP puede ocurrir después de ciertos tipos de cirugía.

Rivaroxaban se usa también en personas con fibrilación auricular (trastorno del ritmo cardíaco) para disminuir el riesgo de accidente cerebrovascular causado por un coágulo de sangre.

¿Qué personas no pueden recibir ANTITROM®?

No use este medicamento si Ud. sabe que es alérgico a algunos de los ingredientes del medicamento.

Usted no debe usar este medicamento si tiene una válvula artificial en el corazón; o sangrado activo o sin control. NO hay experiencia suficiente en mujeres embarazadas y que amamantan. Las mujeres en edad fértil que reciban **ANTITROM®**, deberían utilizar un método anticonceptivo. Ante cualquier duda consulte a su médico.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

Debe tener bien claro que es fundamental para su salud el correcto cumplimiento del tratamiento con **ANTITROM®**. Un tratamiento irregular puede producir complicaciones serias. Deberá seguir un control periódico con el médico especialista para detectar situaciones en las que puede ser necesario interrumpir el medicamento o ajustar su dosificación.

Si Ud. está tomando algún otro medicamento o si está por tomar uno, o si está embarazada, o si está dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Evite actividades que pueden aumentar su riesgo de sangrado o heridas. Use cuidados extra para prevenir el sangrado mientras se afeita o se lava los dientes.

Dígale inmediatamente al médico si usted tiene algún signo o síntoma de sangrado, como por ejemplo:

- dolor
- hinchazón o molestias
- dolor de cabeza, mareos o debilidad
- moratones anormales,
- sangrado por la nariz, las encías,
- sangrado por cortes que tardan mucho en dejar de sangrar
- flujo menstrual o sangrado vaginal más abundante de lo normal
- orina de color rosado marrón o deposiciones de color rojo o negro
- tos con sangre o vómitos de sangre o de un material con aspecto de grumos de café

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento.

El efecto secundario más frecuente es el sangrado. No empiece a tomar **ANTITROM®** si tiene riesgo de presentar un sangrado anormal sin hablarlo antes con su médico.

Tenga en cuenta que usted tiene mayor riesgo de sangrado si tiene una historia previa de sangrado, si es mayor de 75 años, si sufre de insuficiencia renal, úlcera gástrica o duodenal o está tomando otra medicación que aumente el riesgo de sangrado como heparina, aspirina y otros llamados antiagregantes plaquetarios. Consulte con un profesional médico antes de tomar cualquier tipo de medicación, en especial, antiinflamatorios.

Ante cualquier duda o aparición de algún síntoma durante el tratamiento, consulte con su médico.

Efectos secundarios de menor gravedad pueden incluir: dolores musculares; picazón; o dolor en sus brazos o piernas.

Informe a todo el personal sanitario que le atiende que está tomando **ANTITROM®** antes de una intervención quirúrgica o de un procedimiento invasivo (punciones, extracciones de sangre, extracciones dentarias, etc.). No olvide que con esta medicación puede tener un mayor riesgo de sangrado; tenga en cuenta que durante el tratamiento con este anticoagulante, las inyecciones intramusculares pueden causar hematomas, por lo que deben evitarse. Las inyecciones subcutáneas e intravenosas, por otra parte, no conducen a tales complicaciones.

Es recomendable llevar una identificación en una tarjeta que indique que toma anticoagulante.

¿Cómo se usa ANTITROM®?

Siga exactamente las instrucciones de administración de **ANTITROM®** indicadas por su médico. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas. Pida a su médico que le aclare cualquier cuestión que no entienda contenida en el prospecto que acompaña al medicamento.

ANTITROM® se administra oralmente en un comprimido una vez al día con un poco de agua, con o sin alimentos. La dosis de **ANTITROM®** depende de las dosis de la medicación que el paciente estuviere recibiendo anteriormente.

Rivaroxaban se toma una vez al día o dos veces al día, dependiendo de la razón por la cual usted está usando este medicamento. Siga todas las instrucciones en la etiqueta de su prescripción. Tal vez su médico en ocasiones cambie su dosis para asegurarse de que está obteniendo los mejores resultados. No tome esta medicina en cantidades mayores o menores, o por más tiempo de lo recomendado. Para la fibrilación auricular: Tome el comprimido de 15 o 20 miligramos de rivaroxaban con la cena.

Para la prevención de TVP: Usted puede tomar el comprimido de rivaroxaban 10 miligramos con o sin comidas.

La dosis puede ser modificada por el médico de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Si olvidó tomar su dosis a su hora, tómela lo antes posible, y después continúe con el esquema de dosificación habitual. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

No se auto-medique con **ANTITROM®**. Es importante que usted no ingiera mayor cantidad de **ANTITROM®** que lo indicado por su médico.

No deje de tomar este medicamento sin antes hablar con su médico. Dejar de tomarlo de forma súbita puede aumentar su riesgo de generar un coágulo sanguíneo o un accidente cerebrovascular.

No se espera que una sobredosis accidental cause problemas graves. No obstante, si toma más **ANTITROM®** del que le han indicado, póngase en contacto con su médico.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si tomé más cantidad de la necesaria?

Llame por teléfono a un centro de intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Hospital de Niños R. Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777
Hospital de Pediatría Dr. Garrahan: (011) 4941-8650
Hospital de Clínicas Gral. San Martín: (011) 4961-6001

¿Tiene Ud. alguna pregunta?

Laboratorio Dr. Lazar
011-5550-2900
www.lazar.com.ar

ANMAT responde
0800-333-1234

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ESTE MEDICAMENTO DEBE SER USADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCIÓN Y VIGILANCIA MÉDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN NUEVA RECETA MÉDICA.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Conservación:

Conservar los comprimidos recubiertos en su envase original y a una temperatura no mayor a 30°C.

Presentación:

ANTITROM® 15 y 20 mg: envases con 30 comprimidos recubiertos.

Especialidad Medicinal autorizada por el
Ministerio de Salud.
Certificado N° 57.734



Dr. LAZAR y Cía. S.A.Q. e I.
Av. Vélez Sársfield 5853/5855
B1605EPI Munro, Pcia. De Buenos Aires
Directora Técnica: Daniela A. Casas,
Farmacéutica y Bioquímica.

Última revisión del prospecto: 10/12/2015

36541/2
P261